



Slimību profilakses un kontroles centrs

Duntes iela 22, K-5, Rīga, LV-1005, tālr. 67501590, fakss 67501591, e-pasts info@spkc.gov.lv

EPIDEMIOLOĢIJAS BIĻETENS

Nr. 19 (1516)

2017. gada 11. aprīlī

Pārskats par akūtu augšējo elpceļu infekciju (AAEI) un gripas¹ izplatību 2017. gada 14. nedēļā Latvijā

2017. gada 14. nedēļā (03.04.–09.04.) monitoringā iesaistītajās ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs (informācija saņemta no 69 ģimenes ārstu praksēm) vērsušies 24 pacienti (gripa noteikta klīniski) jeb vidēji 22,6 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem (iepriekšējā nedēļā – 51,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem). Vidēji gripas intensitāte samazinājusies par 55,8%.

Vēršanās ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs citu AAEI gadījumos, salīdzinot ar 13. nedēļas datiem, samazinājusies par 2,4%.

Pacientu vēršanās ambulatorajās iestādēs AAEI, gripas un pneimoniju gadījumos vidēji uz 100 000 iedzīvotājiem²


	Vecuma grupas	10.ned.	11.ned.	12.ned.	13.ned.	14.ned.	Salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu (%)
AAEI	Vidēji	1355,8	1107,8	1202,9	1089,0	1062,5	-2,4
	0-4	6205,0	5112,1	5891,0	5596,6	5154,6	-7,9
	5-14	4445,3	3564,6	3736,3	3481,0	3637,1	4,5
	15-64	847,2	699,5	737,6	637,7	656,9	3,0
	65 un >	285,5	233,3	242,9	224,8	177,9	-20,9
Gripa	Vidēji	132,2	94,9	76,4	51,2	22,6	-55,8
	0-4	295,5	152,0	129,3	36,9	0,0	-100,0
	5-14	338,2	291,2	135,5	48,3	60,3	24,7
	15-64	115,1	71,1	80,5	62,5	23,0	-63,1
	65 un >	46,8	63,2	19,4	19,1	9,4	-51,1
Pneimonija	Vidēji	33,8	34,9	31,5	15,2	21,7	43,1
	0-4	129,3	209,0	147,7	18,5	38,2	106,7
	5-14	67,6	20,1	77,4	9,7	40,2	315,6
	15-64	28,8	28,2	16,1	13,1	20,2	54,3
	65 un >	9,4	19,4	29,1	23,9	14,0	-41,3

Vēršanās ambulatorajās iestādēs pneimoniju gadījumos 14. nedēļā pieaugusi par 43,1%. Samazinājums tika novērots visās vecuma grupās.

¹ klīniskie gripas gadījumi monitoringā iekļautajās iestādēs

²Saslimstības līmenis, vai vēršanās pēc medicīniskās palīdzības nedēļas laikā, tiek aprēķināta pamatojoties uz pacientu skaitu, kas pirmo reizi sakarā ar patreizējo saslimšanas epizodi vērsušies pie ģimenes ārsta.


Vēršanās ambulatorajās iestādēs AAEI gadījumos 2016.—2017. gada sezonā salīdzinājumā ar 2015.—2016. gada un pēdējo piecu sezonu vidējiem rādītājiem



Pacientu vēršanās ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs AAEI gadījumos 2017. gada 14. nedēļā bijusi augstāka nekā iepriekšējā 2015.—2016. gada sezonā un pēdējo piecu sezonu vidējie rādītāji attiecīgajā laika periodā.


AAEI atsevišķās monitoringa teritorijās

Vēršanās AAEI gadījumos ambulatorajās iestādēs monitoringā iekļautajās teritorijās 14. nedēļā samazinājusies piecās teritorijās, pārejās palielinājusies vai palikusi iepriekšējās nedēļas līmenī (Valmiera). Visaugstākā intensitāte bijusi Daugavpilī un Ventspilī.




AAEI atsevišķās vecuma grupās

Kopš monitoringa sākuma (2016. gada 40. nedēļa) visaugstākā AAEI intensitāte reģistrēta bērniem 0–4 gadu vecuma grupā. 2017. gada 14. nedēļā saslīkstība samazinājusies 0–4 gadu un 65 un > gadu vecuma grupā.




Vēršanās ambulatorajās iestādēs gripas gadījumos 2016.—2017. gada sezonā salīdzinājumā ar 2015.—2016. gada un pēdējo piecu sezonu vidējiem rādītājiem



2017. gada 14. nedēļā pacientu vēršanās ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs gripas gadījumos bijusi līdzīga iepriekšējās 2015.-2016. gada sezonas rādītājiem attiecīgajā laika periodā. Gripas aktivitātes samazināšanās tendence saglabājas kopš 2017. gada 6. nedēļas.


Gripas atsevišķās monitoringa teritorijās

Gripas gadījumi (gripa noteikta klīniski) monitoringā iesaistītajās ambulatorajās veselības aprūpes iestādēs reģistrēti sešs no 10 monitoringā iekļautajām teritorijām. Gripas intensitātes pieaugums 14. nedēļā reģistrēts tikai Jelgavā, pārējās teritorijās tā samazinājusies. Nevienā no teritorijām gripas intensitāte nav pārsniegusi 100 gadījumus uz 100 000 iedzīvotājiem.




Gripas atsevišķās vecuma grupās

Visaugstākā saslimstība (gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem attiecīgajā vecuma grupā) 14. nedēļā novērota 5–14 gadu vecuma grupā, citās vecuma grupās saslimstība samazinājusies.




Par stacionētiem pacientiem gripas gadījumos

Stacionēto pacientu skaits gripas gadījumos samazinājies par 42%, savukārt stacionēto pacientu skaits gripas izraisītās pneimonijas gadījumos samazinājies par vienu gadījumu. Saņemta informācija par 48 hospitalizētiem pacientiem saistībā ar gripas infekciju: 37 pacienti stacionēti gripas gadījumos un 11 pacienti – gripas izraisītās pneimonijas gadījumos. Pacienti stacionēti Daugavpils, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas un Ventspils slimnīcā.




Hospitalizētie pacienti gripas gadījumos pa vecuma grupām


Kopš sezonas sākuma kopā ziņots par 2 442 hospitalizētiem pacientiem: 2 059 gripas gadījumos (42,8% vecumā 15-64 gadi, 28,6% - 65un> gadi, 13% - 5-14 gadu un 15,6% - 0-4 gadu vecuma grupā) un 383 gripas izraisītās pneimonijas gadījumos (51,4% vecumā 15-64 gadi, 46,2% - 65un> gadu vecuma grupā, 1,6% - 5-14 gadu un 0,8% - 0-4 gadu vecuma grupā).



2017. gada 14. nedēļā vislielākais īpatsvars gripas gadījumos hospitalizēto pacientu vidū, bija pacienti 15–64 gadu un 65 un > gadu vecuma grupā (pa 13 pacientiem).




No 11 pacientiem stacionētiem 14. nedēļā gripas izraisītās pneimonijas gadījumos astoņi pacienti bija 15–64 gadu vecumā grupā un trīs pacienti 65 un > gadu vecumā grupā.



Letālie gadījumi 2016.—2017. gada sezonā un divās iepriekšējās sezonās

Kopš sezonas sākuma saņemti 37 paziņojumi par letālo iznākumu pacientiem, kuriem noteikta gripa – 25 gadījumos laboratoriski apstiprināta *A tipa* gripa, 11 – *B tipa* gripa un vienā gadījumā gripa noteikta klīniski (pacients miris mājās). Pacientu vecums no 49 līdz 95 gadiem, vidējais vecums – 79 gadi, 89% (33) no mirušajiem bija vecumā virs 70 gadiem.



Vispārējās izglītības iestāžu apmeklējums (%)

Vispārējās izglītības iestādes 2017. gada 14. nedēļā (ceturtdien) līdzīgi kā 13. nedēļā apmeklēja 92,6% skolēnu.

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Daugavpils	Gulbene	Jelgava	Jēkabpils	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmiera	Ventspils	Vidēji
11.	brīvlaiks										
12.	94,0	93,2	95,3	90,8	91,5	95,5	93,5	92,7	90,8	93,5	93,3
13.	92,7	94,3	93,4	90,5	91,4	96,2	92,1	92,2	91,5	92,4	92,6
14.	91,3	94,1	92,7	90,6	91,0	95,9	91,1	93,6	87,4	92,0	92,6
Salīdzinājumā ar 13. nedēļu (±)	-1,4	-0,3	-0,7	0,1	-0,4	-0,3	-1,1	1,4	-4,1	-0,4	0,0

Pirmsskolas izglītības iestāžu apmeklējums (%)

Pirmsskolas izglītības iestādes 14. nedēļā (ceturtdien) apmeklēja vidēji 78,3% bērnu, kas par 3% vairāk nekā 13. nedēļā.

Monitoringa pilsētas /nedēļas	Daugavpils	Gulbene	Jelgava	Jēkabpils	Jūrmala	Liepāja	Rēzekne	Rīga	Valmiera	Ventspils	Vidēji
11.	65,0	56,2	69,0	65,2	57,6	67,5	64,6	64,8	69,2	62,4	63,9
12.	69,7	65,3	74,7	79,8	68,4	75,4	76,4	75,3	79,5	74,4	73,9
13.	72,5	64,8	70,1	79,8	73,7	74,9	70,5	77,9	82,1	75,2	75,2
14.	71,9	68,5	77,0	82,3	73,1	77,9	78,1	82,2	79,5	79,0	78,3
Salīdzinājumā ar 13. nedēļu (±)	-0,5	3,7	6,9	2,5	-0,6	3,0	7,6	4,3	-2,6	3,8	3,0


Elpceļu vīrusu noteikšana

SIA „Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīca” (RAKUS) stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” laboratorijā 2017. gada 14. nedēļā izmeklēti 203 personu klīniskie paraugi, no tiem 29,1% paraugu noteikti gripas vīrusi. Kopā noteikti 59 gripas vīrusi, t.sk. seši *A tipa* (10%) un 53 (90%) *B tipa* gripas vīrusi. Noteikti arī citi elpceļu infekciju vīrusi (pavisam 86), no tiem visvairāk noteikts respiratori sincitiālais vīruss (27) un rinovīruss (27).


Nedēļas	Izmeklēto paraugu skaits	A gripa	B gripa	Paragripa I	Paragripa II	Paragripa III	Paragripa IV	RSV	Adenovīrusi	Rinovīrusi	hMPV	Bokavīrusi	Koronavīrusi	Enterovīrusi	Pozitīvo paraugu skaits	Pozitīvo paraugu īpatsvars (%)	Gripas pozitīvo īpatsvars (%)	RSV pozitīvo īpatsvars (%)	Gripa no pozitīvo paraugu skaita (%)
40.	39					5				1					6	15,4	0,0	0	0
41.	32					2		2	4					2	10	31,3	0,0	0	0
42.	52			1		2		5	8			2	1	3	22	42,3	0,0	0	0
43.	68			1		3		3	5						12	17,6	0,0	0	0
44.	73					14		2	3	1		1			21	28,8	0,0	2,7	0
45.	59	2				5		2	4	2		1			16	27,1	3,4	3,4	12,5
46.	67	1			1	8	1	1	4	1	1	1			19	28,4	1,5	1,5	5,3
47.	88	4						1	10			3	1		19	21,6	4,5	1,1	21,1
48.	82	3				7	1	5	8	7	2	4		4	41	50,0	3,7	6,1	7,3
49.	112	12				4		5	8	9		6	1	5	50	44,6	10,7	4,5	24
50.	138	19	1		1	7	1	7	11	11	1	9	7	1	76	55,1	14,5	5,1	26,3
51.	181	38	5			9	1	6	3	6		3	2		73	40,3	23,8	3,3	58,9
52.	233	76	12		1	7	3	8	17	20	2	17	9	4	176	75,5	37,8	3,4	50
01.	268	76	10			4	1	17	32	18	8	12	11	1	190	70,9	32,1	6,3	45,3
02.	329	122	16			2	3	14	12		3	6	4	1	183	55,6	41,9	4,3	75,4
03.	397	161	21		2	4		31	13	15	5	15	6		273	68,8	45,8	7,8	66,7
04.	549	237	30			4		16	7	11	4	3	4	1	316	57,6	48,6	2,9	84,5
05.	610	244	44			3	1	61	15	15	11	13	9	4	416	68,2	47,2	10	69,2
06.	584	235	63	1		3	3	46	20	16	6	15	9	3	417	71,4	51,0	7,9	71,5
07.	597	232	110	1		1		41	19	17	5	15	12	2	455	76,2	57,3	6,9	75,2
08.	609	180	163	1				32	14	18	7	6	7	1	429	70,4	56,3	5,3	80
09.	551	159	158	1		2	1	38	14	17	20	9	8	2	429	77,9	57,5	6,9	73,9
10.	440	97	120			2		36	14	17	13	11	6		316	71,8	49,3	8,2	68,7
11.	403	65	141			2		32	13	18	14	11	8		304	75,4	51,1	7,9	67,8
12.	323	28	101			1	3	25	8	13	6	5	6		196	60,7	39,9	7,7	65,8
13.	239	19	80	1			4	30	12	28	7	7	2	2	192	80,3	41,4	12,6	51,6
14.	203	6	53	1		2		27	5	27	10	9	2	3	145	71,4	29,1	13,3	40,7
Kopā	7326	2016	1128	8	5	103	23	483	276	305	125	183	116	39	4810	65,7	42,9	6,6	65,4

Kopš sezonas sākuma pavisam noteikti 3144 gripas vīrusi: 2016 (64%) A tipa gripas vīrusi (no tiem 322 tipēti – visi kā A/H3) un 1128 (36%) B tipa gripas vīrusi; no tiem raksturoti: 167 B/Yamagata līnijas (nav iekļauts trīs-komponentu vakcīnā) un 25 – B/Victoria līnijas (iekļauts trīs-komponentu vakcīnas sastāvā).

Izmeklēto paraugu skaits un gripas pozitīvo paraugu īpatsvars pa nedēļām



Laboratoriski noteikto A tipa, B tipa gripas vīrusu un RSV skaits pa nedēļām



Gripas vīrusu ģenētiskais raksturojums

Kopš sezonas sākuma ģenētiski raksturots 30 *A tipa* gripas vīrusi – visi kā *A/HongKong/4801/2014(H3N2)*–līdzīgs vīruss un 35 *B tipa* gripas vīrusi raksturoti kā *B/Phuket/3073/2013Yamagata* -līnijas (nav iekļauts trīs komponentu sezonālā gripas vakcīnā).

Laboratoriskie izmeklējumi gripas monitoringa tīkla ietvaros

No 31 ģimenes ārsta praksēm, kas iesaistītas gripas monitoringa tīklā Rīgas pilsētā, desmit veic pacientu izmeklēšanu elpceļu vīrusu noteikšanai. Kopš sezonas sākuma piecās ģimenes ārstu praksēs tika izmeklēti 55 pacienti ar aizdomām par gripas infekciju. Divdesmit gadījumos (22/55 jeb 40%) apstiprināta gripa, t.sk. 17 gadījumos noteikts *A tipa* gripas vīruss un piecos gadījumos – *B tipa* gripas vīruss. Noteikti citi elpceļu vīrusi – seši koronavīrusi, divi paragripa IV tipa, divi rinovīrusi, divi cilvēka metapneimovīrusi, viens respiratori sincitiālais vīruss, viens adenovīruss un viens bokavīruss.

Secinājumi

2017. gada 14. nedēļā gripas intensitāte Latvijā turpināja samazināties. Gripas gadījumi ambulatorajās iestādēs reģistrēti sešās monitoringā iekļautajās teritorijās. Šī bija pirmā nedēļa kopš epidēmijas paziņošanas, kad nevienā no pilsētām intensitāte nav sasniegusi 100 uz 100 000 iedzīvotājiem. Stacionēto pacientu skaits gan gripas gadījumos, gan gripas izraisītās pneimonijas gadījumos samazinājies.

No sezonas sākuma (2016. gada 40. nedēļa) līdz 2017. gada 9. nedēļai Latvijā pārsvarā cirkulēja *A tipa* gripas vīrusi, sākot ar 10. nedēļu dominē *B tipa* gripas vīrusi.

Eiropas gripas uzraudzības tīkla informācija par 2017. gada 13. nedēļu.

<http://flunewseurope.org/>

2017. gada 13. nedēļā PVO Eiropas reģionā gripas intensitāte turpināja samazināties, lielākā daļa valstu informēja par zemu gripas intensitāti. Visās 43 valstīs, kuras informēja par gripas intensitāti, gripas intensitāte atgriezusies starp-sezonu līmenī. Par ģeogrāfisku izplatību informēja 45 valstis, no tām trīs - par plašu gripas izplatību un 29 par lokālu vai sporādisku Gripas pozitīvo paraugu īpatsvars iepriekšējās nedēļas līmenī - 16% (12.nedēļā - 19%). *A tipa* gripas vīrusi noteikti 10% un *B tipa* 90% gadījumu. Šī bija trešā nedēļa šajā sezonā, kad Eiropas reģionā dominēja *B tipa* gripas vīrusi, taču kopējais vīrusu skaits paliek zems.

Par dominējošo *A tipa* gripu informēja Zviedrija, Islande, Anglija (Lielbritānijas), Kosova un Grieķija, 11 valstīs dominēja *B tipa* gripas vīrusi - Armēnija, Čehija, Krievijas Federācija, Latvija, Lielbritānija (Skotija), Moldova, Polija, Rumānija, Slovēnija, Turcija un Ukraina.

Gripas vīrusu noteikšana un tipēšana

Gripas uzraudzības tīkla ietvaros š.g. 13. nedēļā izmeklēti 1 606 paraugi. Noteikti gripas vīrusi: 39% *A tipa* un 61% *B tipa* gripas vīrusi. Kā parasti gripas sezonas otrajā pusē *B tipa* gripas vīrusu proporcija palielinās. No visiem paraugiem, kuros noteikts *A tipa* gripas vīrusa apakštīps, (149) 96% paraugu tas tipēts kā *A/H3N2*. No raksturotajiem 14 *B tipa* gripas vīrusiem 12 (86%) no *B/Yamagata* līnijas un divi (14%) – *B/Victoria* līnijas.

Noteikto gripas vīrusu tipēšana gripas uzraudzības tīkla ietvaros

Vīrusa tips un apakštīps	Noteikto vīrusu skaits			
	12. nedēļa		Sezona kopā	
	skaits	%	skaits	%
A gripa	630	39	108 341	90
<i>A/H1N1 pdm09</i>	5	3	345	1
<i>A/H3N2</i>	149	96	38 637	99
<i>A tipa</i> gripa (netipēts)	476	-	69 359	-
B gripa	976	61	11 422	10
<i>B/Victoria</i> līnija	2	14	286	26
<i>B/Yamagata</i> līnija	12	86	832	74
Līnija nav zināma	962	-	10 304	-
Noteikto vīrusu skaits kopā (izmeklēto paraugu skaits)	1 606 / 12 903	-	119 763 / 525 266	-

Kopš 2016. gada 40. nedēļas visbiežāk (90%) tika noteikts *A tipa* gripas vīruss. No visiem tipētiem *A tipa* gripas vīrusiem visbiežāk (99%) noteikts *A/H3N2* apakštīps. No visiem raksturotiem *B tipa* gripas vīrusiem 74% paraugos noteikti *B/Yamagata* līnijas vīrusi un 26% – *B/Victoria* līnijas vīrusi.

Ārpus gripas uzraudzības tīkla iestādēs (slimnīcās, skolās, pansionātos un citās aprūpes iestādēs) 12. nedēļā izmeklēti 1 799 paraugi, no tiem 45% gadījumu noteikti *A tipa* gripas vīrusi (no tiem 96% paraugi tipēti kā *A/H3N2*) un 55% gadījumu – *B tipa* gripas vīrusi.

Par SARI uzraudzību un stacionāriem laboratoriski apstiprinātiem gripas gadījumiem

No 11 valstīm, kuras veic smagu akūtu respiratoru infekciju (SARI) uzraudzību, 13. nedēļā 8 valstis informēja par 581 SARI gadījumu. No tiem 140 tika izmeklēti un 38 (27%) noteikti gripas vīrusi.

Kopš 2016. gada 40. nedēļas 16 valstīs tika reģistrēti 33 519 SARI gadījumi, no tiem 9 704 tika izmeklēti laboratoriski, t.sk. 35% noteikti gripas vīrusi: 79% noteikta *A tipa* gripa un 21% *B tipa* gripa. No visiem *A tipa* gripas vīrusiem 92% bija tipēti kā *A/H3N2*, mazāk par 1% bija *A/H1N1pdm09* un 8% netipēti.

Savukārt no deviņām valstīm, kuras apkopo informāciju par stacionāriem pacientiem ar laboratoriski apstiprinātu gripu intensīvās terapijas nodaļās (ITN) un citās nodaļās, 13. nedēļā saņemta informācija no trim valstīm par 16 gadījumiem, t.sk. 13 gadījumi no ITN (10 gadījumos apstiprināta *A tipa* gripa un trīs gadījumos *B tipa* gripa) un trīs gadījumi no citām nodaļām (diviem noteikta *A/H3N2* un vienam – *B tipa* gripa).

Kopš sezonas sākuma lielākā daļa hospitalizēto pacientu, kuriem laboratoriski tika apstiprināta gripa, bija pacienti 65 un > gadu vecuma grupā. No visiem 2 554 ITN gadījumiem, par kuriem ir pieejami dati par vecumu un gripas vīrusu tipēšanas rezultātiem, lielākā daļa (64%) pacientu bijuši vecumā 65 un > gadi, 30% pacientu vecumā no 15 līdz 64 gadiem un 5% jaunāki par 15 gadiem.

Ziņots par 887 nāves gadījumiem, no tiem 495 nāves gadījumi bija reģistrēti ITN un 392 gadījumi citās slimnīcu nodaļās; 725 (82%) pacienti bija vecāki par 65 gadiem; 99% gadījumi bija saistīti ar *A tipa* gripas vīrusiem, no visiem tipētiem gripas vīrusiem 99% tipēti kā *A/H3N2*.

Gripas vīrusu ģenētiskais raksturojums

Kopš sezonas sākuma līdz 2017. gada 13. nedēļai ir pieejami dati par ģenētiskajām grupām 2 914 gripas vīrusam. No visiem *A/H3N2* vīrusiem 814 (27,9%) pieder pie ģenētiskās grupas 3C.2a (iekļauta vakcīnas sastāvā) un 1 812 (62,2%) – pie ģenētiskās apakšgrupas 3C.2a1, kas parādījusies nesen. Vīrusi šajās divās apakšgrupās ir antigēniski līdzīgi, taču 3C.2a1 apakšgrupa strauji mainās: parādās vīrusu klasteri ar papildu aminoskābju aizvietošanu hemaglutinīnā, kuru ietekme uz antigēnu īpašībām vēl nav noskaidrota.

Filoģenētiskā grupa	Noteikto vīrusu skaits	%
<i>A/H1N1pdm09A/Michigan/45/2015</i> (apakšgrupa 6B.1) ^{b,c}	28	1,0
<i>A/H1N1pdm09A/South Africa/3626/2013</i> (apakšgrupa 6B)	5	0,2
<i>A/H3N2 A/Bolzano/7/2016</i> (apakšgrupa 3C.2a1)	1 812	62,2
<i>A/H3N2 A/Hong Kong/4801/2014</i> (apakšgrupa 3C.2a) ^{a,b,c}	814	27,9
<i>A/H3N2 A/Switzerland/9715293/2013</i> (apakšgrupa 3C.3a)	24	0,8
<i>A(H3N2) A/Stockholm/28/2014</i> (subgroup 3C.3b)	1	0,0
<i>A/H3N2</i> , apakšgrupa nav noteikta	6	0,2
<i>B/Brisbane/60/2008</i> (Victoria līnija, apakšgrupa 1A) ^{a,b,c}	54	1,9
<i>B/Phuket/3073/2013</i> (Yamagata līnija, apakšgrupa 3) ^d	170	5,8
Kopā	2 914	100

^a Sezonālās vakcīnas sastāvā Ziemeļu Puslodei 2016-2017. gada sezonai

^b Vakcīnas sastāvā Dienvidu Puslodei 2017. gada sezonā

^c Sezonālās vakcīnas sastāvā Ziemeļu Puslodei 2017-2018. gada sezonai

^d Četru komponentu vakcīnas sastāvā Ziemeļu un Dienvidu puslodei

Kopš sezonas sākuma testēti 1 465 gripas vīrusu (1 336 – *A/H3N2*, 26 – *A/H1N1pdm09* un 103 – *B* tipa gripas vīrusi) uz jutību pret neiraminidāzes inhibitoriem (oseltamivir, zanamivir). Viens *A/H3N2* gripas vīruss uzrādījis samazināto inhibīciju pret oseltamiviru.

Kopējās mirstības uzraudzība EuroMOMO projekta ietvaros

<http://www.euromomo.eu/>

Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas 19 valstis piedalās projektā EuroMOMO (*European Monitoring of Excess Mortality for Public Health Action*) un ziņo par kopējās mirstības iknedēļas rādītājiem. Lielākajā daļā valstu bija novērots kopējās mirstības pieaugums iedzīvotājiem 65 un > gadu vecuma grupā, tomēr tagad tas, šķiet, ir normalizējies. Visaugstākie mirstības rādītāji sakrīta ar *A/H3N2* gripas vīrusa cirkulāciju. Tomēr vēl pārāgri izdarīt secinājumus par kopējo gripas ietekmi uz mirstību, jo gada sākumā vairākās valstīs bija novēroti auksti laika apstākļi, kas, iespējams, veicināja mirstības pieaugumu.

Agrīnā vakcīnas efektivitātes uzraudzība Somijā un Zviedrijā noteica gripas vakcīnas efektivitātes līmeni personām 65 un > gadu vecuma grupā – 26%. Nesen iegūtie vakcīnas efektivitātes rādītāji visās vecuma grupās pret *A/H3N2* gripas vīrusiem: Kanādā – 42%, ASV – 43% un Eiropā – 38% (saskaņā ar Zviedrijas un Somijas aprēķiniem sezonas sākumā).

Nemot vērā suboptimālu vakcīnas efektivitāti, visām riska grupām gripas aizdomu vai laboratoriski apstiprinātas gripas gadījumos ieteicama neatliekama neiraminidāzes inhibitoru lietošana, ideālā gadījumā 48 stundu laikā pēc simptomu parādīšanās, gan vakcinētām, gan nevakcinētām personām. Turklāt vienmēr būtu apsverama profilaktiska antivirālo līdzekļu lietošana augsta riska kontakta personām.

PVO rekomendētais pretgripas vakcīnas sastāvs 2017.–2018. gada sezonā Ziemeļu puslodē http://www.who.int/influenza/vaccines/virus/recommendations/2017_18_north/en/

2017. gada 2. martā publicēts PVO ziņojums par vakcīnas sastāvu nākamajai 2017.-2018. gada sezonai. Trīs-komponentu vakcīnas sastāvā 2017.-2018. gada sezonai Ziemeļu puslodē rekomendē:

- *A/Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09*-līdzīgs vīruss;
- *A/Hong Kong/4801/2014 (H3N2)*- līdzīgs vīruss;
- *B/Brisbane/60/2008*- līdzīgs vīruss;

Četru komponentu vakcīnā papildus jāiekļauj B tipa gripas *B/Phuket/3073/2013*- līdzīgs vīruss. Vakcīnas sastāvs līdzīgs sezonālajai vakcīnai Dienvidu puslodē 2017. gada sezonai.

Gripas profilakses ieteikumi iedzīvotājiem, izglītības iestādēm, darba devējiem, veselības aprūpes speciālistiem atrodami SPKC interneta vietnē – <https://www.spkc.gov.lv/lv/tavai-veselibai/infekcijas-slimibas/gripa/>.

Materiālu sagatavoja: SLIMĪBU PROFILAKSES UN KONTROLES CENTRA Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta Infekcijas slimību uzraudzības un imunizācijas nodaļas epidemioloģe Raina Nikiforova.

2016.–2017.gada AAEI un gripas monitoringa 14. nedēļā datus sniedza:

- 68 primārās veselības aprūpes ārsti (reģistrēto pacientu skaits 105508– 5,4% no Latvijas iedzīvotāju skaita)
 - 11 stacionārās ārstniecības iestādes
 - 37 vispārējās izglītības iestādes
 - 36 pirmsskolas izglītības iestādes
- Izmantoti SIA Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas (RAKUS) stacionāra „Latvijas Infektoloģijas centrs” (LIC) laboratorijas dati.

Pateicamies visiem monitoringa dalībniekiem par sniegto informāciju.

Datu pārpublicēšana un citēšana – atsauce uz Slimību profilakses un kontroles centra “Epidemioloģijas biļetenu” ir obligāta.