



Slimību profilakses un kontroles centrs

Bērnu vakcinācijas kalendārs 2022. gadā

Vakcinācijas kalendārs ir viegli lietojams – atrodi bērna vecumu un uzzini, pret kuru infekcijas slimību, atbilstošajā vecumā, bērns jāvakcinē

0–12 stundas	B hepatīts ¹	<p>Vakcinācijas kalendārā iekļautās vakcinācijas par valsts budžeta līdzekļiem pienākas ikvienam bērnam, arī tad, ja viņš nav bijis vakcinēts savlaicīgi (medicīnisku vai citu iemeslu dēļ).</p> <p>¹ Vakcinu pret B hepatītu pirmajās 0-12 dzīves stundās ievada tikai riska grupas jaundzimušajiem (bērniem, kuri dzimuši mātēm, kuras inficētas ar B hepatītu (B hepatīta virsmas antigēna (HBsAg) pozitīvām mātēm) vai mātēm, kuras nebija pārbaudītas HBsAg klātbūtnes noteikšanai. Turpmākās vakcīnas devas ievada atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai.</p> <p>² Ja vakcinācija pret tuberkulozi tiek veikta bērnam, sasniedzot 2 mēnešu vecumu, pirms vakcinācijas tiek veikts tuberkulīna ādas tests (Mantū reakcija), lai izslēgtu iespējamo bērna inficēšanos ar tuberkulozi.</p> <p>³ Vakcinācijas kurss pret rotavīrusu infekciju ietver divas vai trīs vakcinācijas atbilstoši esošās vakcīnas lietošanas instrukcijai.</p>		
no 12 stundām	Tuberkuloze ²			
no 6 nedēļām	Rotavīrusu infekcija ³			
2 mēneši	<p>KOMBINĒTĀ VAKCĪNA Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts</p>	Pneimokoku infekcija		
4 mēneši	<p>KOMBINĒTĀ VAKCĪNA Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts</p>	Pneimokoku infekcija		
6 mēneši	<p>KOMBINĒTĀ VAKCĪNA Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts</p>			
6–23 mēneši (ieskaitot)	Gripa ⁴	⁴ Vakcinācija pret gripu sešus līdz 23 mēnešus (ieskaitot) veciem bērniem.		
12–15 mēneši	<p>KOMBINĒTĀ VAKCĪNA Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts, b tipa <i>Haemophilus influenzae</i> infekcija, B hepatīts</p>	<p>KOMBINĒTĀ VAKCĪNA Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas</p>	Pneimokoku infekcija	Vējbakas
7 gadi	<p>KOMBINĒTĀ VAKCĪNA Difterija, stinguma krampji, garais klepus, poliomiēlīts</p>	<p>KOMBINĒTĀ VAKCĪNA Masalas, epidēmiskais parotīts, masaliņas</p>	Vējbakas	
12 gadi	Cilvēka papilomas vīrusa infekcija ⁵	⁵ Valsts apmaksāta vakcinācija pret cilvēka papilomas vīrusu pieejama gan meitenēm (12-17 gadu vecumā), gan zēniem (12-14 gadu vecumā).		
14 gadi	<p>KOMBINĒTĀ VAKCĪNA Difterija, stinguma krampji, garais klepus</p>			
2–18 gadi	Gripa ⁶	⁶ Vakcinācija pret gripu bērniem vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kuri pieder pie šādām veselības riska grupām: bērni ar hroniskām plaušu slimībām, hroniskām kardiovaskulārām slimībām neatkarīgi no to cēloņa, hroniskām vielmaiņas slimībām, hroniskām nieru slimībām, bērniem ar imūndeficītu, bērniem, kuri saņem imūnsupresīvu terapiju, kuri ilgstoši saņem terapiju ar <i>ac. acetylsalicylicum</i> .		

Atceries!

Vakcinācija ir labākais un efektīvākais veids, kā bērnu pasargāt no bīstamām un nāvējošām infekcijas slimībām! Nevakcinētam bērnam apmeklējot sabiedriskas vietas, palielinās inficēšanās risks gan pašam, gan apkārtējiem. Ļoti svarīgi sekot līdzi vakcinācijas kalendāra ievērošanai un laikus izdarīt paredzētās vakcinācijas, lai aizsargātu bērnu pirms tas sasniedz vecumu, kad inficēšanās risks ir visaugstākais.

Atbilstošajā vecumā paredzētās vakcinācijas ir iespējams veikt vienlaicīgi un tas nemazina to iedarbību.

Ja Jums radās jautājumi par bērna vakcināciju, iesakām vērsties pie ģimenes ārsta.