

# Difterija - dzīvībai bīstama




Slimību profilakses un kontroles centrs

Materiāls sagatavots 2016. gadā

**Gandrīz katrs trešais difterijas gadījums Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas valstu vidū 2011. - 2015. gadā tika reģistrēts Latvijā!**

**70 %**  
citās ES/EEZ valstīs



**30 %**  
Latvijā

**Latvijā vidēji 10**  
ik gadu reģistrēti  
saslimšanas gadījumi ar difteriju:

**31 %**  
bērni un pusaudži

**69 %**  
nevaccinētas personas

**20 %**  
ar smagu slimības gaitu

**10 %**  
attīstījās nopietnas komplikācijas kā miokardīts un nieru mazspēja

**6 %**  
saslimšana ar difteriju bija letāla

**5 - 20 %** (atkarībā no vecuma) saslimušo ar difteriju mirst

biežāk bērni <5 gadiem un pieaugušie >40 gadi

Smaga slimības gaita, komplikācijas un nāves gadījumi tiek reģistrēti nevaccinētām personām

## Difterijas nūjiņas izplatās:



**Difteriju izraisošās baktērijas producē spēcīgu toksīnu, kas izplatoties organismā, izraisa sirds muskuļu, nervu sistēmas un citu orgānu bojājumus**

## Difterijas simptomi ir:



nespēks



bāli pelēks, biezs aplikums uz mandelēm un rīkles galā



apetītes trūkums



sāpes kaklā, rīšanas grūtības



galvassāpes



aizsmakums, rejšs klepus



drudzis



elpas trūkums

Difterija visbiežāk skar elpceļus, bet var skart arī citus orgānus un audus - acis, ādu, dzimumorgānus, sirdi, nieris un nervu sistēmu.

## Ja difterija netiek laikus atklāta un ārstēta, var attīstīties sarežģījumi:

- pneimonija
- elpceļu nosprostošanās, nosmakšana
- nieru bojājums un mazspēja
- nervu sistēmas bojājumi un paralīzes
- sirds bojājums, sirdsdarbības ritma traucējumi un apstāšanās
- nāve

## Saslimšanu ar difteriju var novērst

savlaicīgi un regulāri vakcinējoties.



**Bērniem**, atbilstoši Vakcinācijas kalendāram, vakcināciju pret difteriju veic 2, 4, 6 mēnešu vecumā (pamatvakcinācija) un balstvakcinācijas 12-15 mēnešu vecumā, bet pēc tam - 7 un 14 gadu vecumā.

**Imunitāte** nesaglabājas visu mūžu, tā pakāpeniski samazinās, tāpēc ik pēc 10 gadiem pieaugušajiem ir nepieciešams veikt balstvakcināciju, bet riska grupās - ik pēc pieciem gadiem.

**Pārliecinies par savu un citu ģimenes locekļu vakcinācijas statusu** un ja nepieciešams vakcinēties nekavējoties - dodies pie sava ģimenes ārsta! Vakcinācija pret difteriju Latvijā kā bērniem tā pieaugušajiem tiek veikta par valsts budžeta līdzekļiem.