

Ārstniecības iestādes nosaukums _____

Kods

PAZIŅOJUMS PAR HIV INFIĒTAS PERSONAS VAI AIDS PACIENTA NĀVI

(veidlapa Nr. HIV-8)

Pacienta uzvārda kods² __ - __ - __ - __

Dzimums (vajadzīgo atzīmēt): vīrietis sieviete

Pacienta personas kods -

Dzimšanas gads

Dzīvesvieta (novads vai pilsēta, ja dzīvo Rīgā, norādīt arī rajonu) _____

HIV infekcija apstiprināta (dd.mm.gggg) ..

Pacienta reģistrācijas numurs¹ HIV infekcijas un AIDS saslimšanas gadījumu reģistrā _____

HIV vīrusa tips (vajadzīgo atzīmēt): HIV-1 HIV-2

AIDS diagnoze kopš (dd.mm.gggg) ..

Nāves iestāšanās datums (dd.mm.gggg) ..

Nāves iemesls _____

Ja nāves iemesls ir AIDS, atzīmēt trīs vadošās indikatorslimības:

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> Berkita limfoma | <input type="checkbox"/> kokcidiomikoze, ekstrapulmonāla |
| <input type="checkbox"/> citomegalovīrusa infekcija | <input type="checkbox"/> kriptokokoze, ekstrapulmonāla |
| <input type="checkbox"/> citomegalovīrusa izraisīts retinīts | <input type="checkbox"/> kriptosporidoze ar caureju, ilgāku par vienu mēnesi |
| <input type="checkbox"/> <i>Herpes simplex</i> : čūlas ilgāk par vienu mēnesi, bronhīts, pneimonīts, ezofagīts | <input type="checkbox"/> limfoidāla intersticiāla pneimonija vai pulmonāla limfoidāla hiperplāzija bērnam, jaunākam par 15 gadiem |
| <input type="checkbox"/> HIV izraisīta encefalopātija (demence) | <input type="checkbox"/> <i>Mycobacterium avium</i> izraisīta ekstrapulmonāla slimība |
| <input type="checkbox"/> HIV izraisītais "izsīkuma" sindroms | <input type="checkbox"/> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> izraisīta pulmonāla slimība |
| <input type="checkbox"/> histioplazmoze: diseminēta vai ekstrapulmonāla | <input type="checkbox"/> <i>Mycobacterium tuberculosis</i> izraisīta ekstrapulmonāla slimība |
| <input type="checkbox"/> imunoblastiska limfoma | <input type="checkbox"/> primāra smadzeņu limfoma |
| <input type="checkbox"/> invazīva dzemdes kakala carcinoma | <input type="checkbox"/> pneimocistu pneimonija |
| <input type="checkbox"/> hroniska izosporāze, ilgāk par vienu mēnesi | <input type="checkbox"/> pneimonijas, atkārtoti 12 mēnešu laikā |
| <input type="checkbox"/> kandidoze: trahejas, bronhu, plaušu | <input type="checkbox"/> salmonella izraisīta sepse |
| <input type="checkbox"/> kandidoze: barības vada | <input type="checkbox"/> smadzeņu toksoplazmoze |
| <input type="checkbox"/> Kapoši sarkoma | <input type="checkbox"/> progresējoša multifokāla leikoencefalopātija |
| | <input type="checkbox"/> citas _____ |

Ārsts _____

(paraksts, personīgais spiedogs)

Ārsta darba vieta _____

Datums (dd.mm.gggg) ..

Tālruņa numurs _____

Piezīmes

1.¹Norādīt tikai tiem pacientiem, kuri iekļauti HIV infekcijas un AIDS saslimšanas gadījumu reģistrā.

2.²Uzvārda kodēšanas principi, izmantojot vienu burtu un trīs ciparu zīmes, ir šādi:

2.1. Uzvārda pirmais burts tiek saglabāts, tam seko trīs ciparu zīmes:

AĀ, EĒ, ĪĪ, O, UŪ, H - koda **numura nav**;

B, F, P, V - kods **1**;

CČ, GG, J, KĶ, SŠ, ZŽ - kods **2**;

D, T - kods **3**;

LĻ - kods **4**;

NŅ, M - kods **5**;

R - kods **6**;

2.2. Līdzskaņus pēc sākuma burta kodē atbilstoši numuriem, piemēram:

BURKĀNS **B-625**;

2.3. Kodā vienmēr jābūt trim cipariem, tāpēc garajos uzvārdos kodē tikai sākotnējos līdzskaņus, bet nākamos vienkārši ignorē;

2.4. Īsajos uzvārdos rīkojas pretēji – trūkstošo līdzskaņu vietā raksta nulles, piemēram:

RĪTENKNAUCERS **R-352**

OGA **O-200**

2.5. Dubultie līdzskaņi (LL, MM, u.c.), kā arī blakus esošie, viena koda numuram piederošie (CK, DT) līdzskaņi tiek šifrēti ar vienu koda numuru, piemēram:

BLLS **B-420**;